

Isolerad hyperterm perfusion (ILP)


Patientinformation

Denna information riktar sig till Dig som blivit rekommenderad/erbjuden operation med Isolerad Hyperterm Perfusion (Isolated Limb Perfusion, ILP).

Isolerad hyperterm perfusion är en regional cancerterapi som möjliggör att ge en mycket hög koncentration av cytostatika i en arm eller ett ben med liten risk för biverkningar i resten av kroppen. Operationen görs i Sverige endast på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Det görs cirka 40 ingrepp årligen och omfattar patienter med malignt melanom eller olika typer av mjukdelstumörer.

Hur går operationen till?

Extremiteten (arm eller ben) isoleras kirurgiskt med friläggning av artär och ven och ansluts till en hjärt-lungmaskin. Blodförsörjningen av extremiteten sker då helt via hjärt-lungmaskinen och till denna tillsätts höga doser av cytostatika som pumpas genom extremiteten under 60-90 minuter. Därefter sköljs cytostatikan bort och den normala blodcirkulationen återställs.



Vårdtid

Du kommer till vårdavdelningen dagen före operation. Vid lång resväg kan det bli aktuellt med inläggning två dagar före operationen, detta kommer Du och Din läkare/sjuksköterska överens om. Operationen tar cirka 3-4 timmar och sker i narkos. Efter operationen vårdas Du på en uppvakningsavdelning innan Du kommer tillbaka till vårdavdelningen, vanligen på eftermiddagen eller kvällen samma dag.

Operationssåret sys med stygn som försvinner av sig självt. Om såret sytts med stygn som inte försvinner av sig själva, ska dessa oftast tas bort cirka 2 veckor efter behandlingen, och du får då en remiss till distriktssjuksköterskan för detta. Den totala vårdtiden är mellan 3-5 dagar, men kan variera.

Fysisk aktivitet

Det är viktigt att du rör dig så mycket som möjligt efter operationen, detta för att bibehålla rörlighet och funktion i den behandlade armen/benet. Om operationen är gjord på benet kan det kännas som att gå på krossat glas efteråt. Ha benet i högläge i vila. Är det armen som är opererad är det viktigt att träna rörligheten i handen. Vid frågor, kontakta Kirurgimottagningen Sahlgrenska får rådgivning.

Biverkningar/effekter

Normalt efter ILP är att den opererade extremiteten svullnar upp, blir rodnad och ömmande. Detta brukar komma 3-5 dagar efter operationen och gradvis öka i omfattning under 2-3 veckor och därefter avta. För många patienter har symtomen försvunnit inom 3 månader men för en del kvarstår symtomen under längre tid. Du kan även utveckla blåsor och du kan tappa naglarna på den behandlande foten eller handen efter operationen. Naglarna växer sedan ut igen.

Uppföljning

Du kommer kallas för återbesök till Kirurgimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset efter cirka 4 veckor samt efter 3-6 månader efter operationen för att följa upp resultatet och hur du mår efter din operation. Ibland kan dessa besöken ske via telefon beroende på din situation. Utöver detta är det vanligtvis inremitterande läkare på ditt hemsjukhus som ombesörjer uppföljningen.

Egna anteckningar

Egna anteckningar

Kontaktuppgifter

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss

Kirurgimottagningen SU/Sahlgrenska 031-342 84 37

Avdelning 132 SU/Sahlgrenska 031-342 11 32